

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

BULLETIN TECHNIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES RHONE-ALPES

AIN, ARDECHE, DROME, ISERE, LOIRE, RHONE, SAVOIE, HAUTE-SAVOIE

EDITION BAS-VIVARAIS

ABONNEMENT ANNUEL: 110f

REGISSEUR RECETTES D.D.A.F.



RÉGION RHÔNE-ALPES 55, rue Mazenod 69426 LYON CÉDEX 03

29 août 1986

N° de série continue 130

Bulletin n°20

**ARBORICULTEURS, VITICULTEURS : RESPECTEZ LES DELAIS D'EMPLOI AVANT LA RECOLTE**

- P.1** TOUTES ESPECES : **Acariens** : des populations parfois nombreuses  
PECHER : **Tordeuse Orientale** : une protection toujours nécessaire  
**Maladies de conservation** : les variétés tardives sont les plus sensibles  
**Oïdium** : surveillez vos jeunes arbres et les variétés sensibles  
POIRIER-POMMIER : **Carpocapse** : diminution du 2ème vol  
**Tordeuse Orientale** : vigilance à proximité des pêchers
- P.2** **Tavelure** : protection indispensable des vergers atteints  
**Maladies de conservation** : intervenez en fonction des risques  
POMMIER : **Mineuse cerclée** : maintenez la protection des vergers destinés à l'export  
VIGNE : **Tordeuses de la grappe** : 3ème vol faible ou nul  
**Botrytis** : 3 semaines avant les vendanges que faire ?  
**Mildiou, Black Rot** : surveillez les parcelles atteintes

## ARBRES FRUITIERS

### TOUTES ESPECES

#### ACARIENS : Surveillez les populations

Les populations nombreuses évoluant dans certains vergers y déposent actuellement leurs pontes qui risquent d'être abondantes. Pensez aussi à la période de récolte.

### PECHER

**TORDEUSE ORIENTALE** : Protéger variétés tardives, jeunes arbres et pépinières le vol a diminué d'intensité, sauf à AURIOLLES, mais la protection est nécessaire.

#### MALADIES DE CONSERVATION : Un temps plus favorable

Le retour de l'humidité (pluies, rosées etc...), un inoculum plus abondant, doivent inciter à protéger soigneusement les dernières variétés.

**OIDIUM** : Protégez en présence de la maladie.

### POIRIER-POMMIER

#### CARPOCAPSE : Moins de risques, à l'exception des régions précoces

- En région précoce (ST JUST, CHAMBONAS) : maintenez encore la protection
- Ailleurs, dans les vergers où aucune attaque de carpocapse n'a été décelée, ni cette année, ni en 1985, on pourra suspendre la protection. Dans le cas contraire, on la poursuivra jusqu'à la récolte.

#### TORDEUSE ORIENTALE : A proximité des pêchers, protégez vos vergers

En utilisant un produit efficace contre les 2 ravageurs à la fois, type phosalone. Lorsque la récolte des pêches est terminée et que les pousses de pêchers sont devenues trop dures, les Tordeuses orientales tendent à se reporter sur les fruits à pépins à proximité.

**TAVELURES : Protégez les vergers atteints jusqu'à la récolte**

En fonction des risques et en évitant les produits qui tachent.

Le retour de l'humidité a déjà provoqué des repiquages qui pourront également atteindre les fruits. En cas de négligence, des fruits sains, mais pollués, seront rentrés au frigo et pourront être retrouvés ponctués de taches de tavelures à l'issue de la période de conservation.

Attention : une simple rosée prolongée suffit à provoquer une contamination.

**MALADIES DE CONSERVATION : Les traitements au verger préparent la conservation au frigo.**

Nous sommes en pleine période de sensibilité pour Golden.

Dans les parcelles à risques de Phytophthora, transmis par les souillures de la terre, on utilisera au moins une fois un fongicide efficace à base de mancozèbe (nb spéc) ou de Tolyfluanide (METHYLEUPARENE interdit 7 jours avant récolte).

Récoltez des fruits bien ressuyés. Ne laissez pas séjourner caisses et pallox dans les vergers.

**POMMIER**

**MINEUSE CERCLEE : Maintenez la protection dans les vergers dont la récolte est destinée à l'export vers les pays d'Amérique du Nord.**

Parmi les autres vergers, seuls ceux subissant une grosse infestation (4 à 5 mines par feuille) justifient encore une protection.

**VIGNE**

**TORDEUSE DE LA GRAPPE : Aucune intervention préventive ne se justifie**

Un 3ème vol négligeable. Quelques captures d'Eudémis ont été enregistrées à ORGNAC et à VALLON. Seuls sont à surveiller les rares foyers habituels d'Eudémis pour éventuellement y intervenir dès réception si plus de 10 % des grappes comportent des attaques récentes. On utilisera alors un produit à action curative.

**BOTRYTIS : Un niveau de risque faible, mais sujet aux conditions climatiques futures.**

Actuellement 2 cas sont à considérer après les dernières chutes de grêle :

- Dans les vignes grêlées, où des baies sont abimées une intervention 3 semaines avant les vendanges est indispensable.

Selon la valeur de la récolte, on préférera une imide cyclique (KIDAN, ROVRAL, SUMISCLEX, RONILAN, SILBOS). On peut également utiliser BASULTRA, EUPARENE, BTF, CODICAP, MYCODIFOL, ORGANIL ou QUINARIS.

- Dans les autres vignes, où les baies sont indemnes, le traitement 3 semaines avant les vendanges ne sera envisagé que dans celles où le Botrytis pose habituellement problème ou si un temps humide persiste. On utilisera alors un fongicide classique, ce qui exclut les imides cycliques.

**MILDIOU : Attention aux attaques d'arrière saison**

Elles peuvent détruire précocement le feuillage, et elles préparent la conservation hivernale du champignon.

Le traitement cuprique a déjà dû être réalisé.

Surveillez le développement de la maladie dans les parcelles atteintes.

**BLACK ROT : Là où il y a des taches, des attaques sur grappes possibles jusqu'aux vendanges.**

**DIVERS**

**RAPPEL** : n'utilisez pas Captane, Captafol et Folpel (nb spéc) dans le mois précédant la récolte, ni sur fruits, ni sur raisin de table.

Ceci à cause des problèmes risquant de se poser à l'exportation.